


# Ausschlussfehler beim Rassegeflügel

## 1. Missbildungen des Skeletts und des Gefieders

Hierzu gehören: krummer oder schiefer Rücken, Kreuzschnabel, stark verkrümmtes Brustbein in S-Form, krumme Zehen, Fehlen der Zehennägel, beiderseitige Entenfüssigkeit, Flügellücke, ständig unter den Armen getragene Handschwingen (sogenannte Hängeflügel, schiefer Schwanz, horizontale Stellung mehrerer Steuerfedern oder der grossen Schwanzdeckfedern, Schenkkipf- oder Säbelflügel beim Wassergeflügel, Löffelschnabel bei den Enten. (Verkrümmung oder Fehlen der Zehennägel an der Ausenzehe ist bei Rassen mit starker Fussbefiederung nicht zu strafen. Einseitige Entenfüssigkeit und nicht ganz korrekte Stellung der Schwanzdeckfeder sind keine Ausschlussfehler, sondern unter Berücksichtigung der Rassennunterschiede nach Ermessen des Preisrichters als Fehler zu werten.)




Einfachkamm

## 3. Kammformen: links grobe Fehler, rechts Kammformen




Doppelzacken




Mehrfachdornkamm




Rosenkamm feingepert



Igel- oder Rosenkamm




Kreuzschnabel




Kammauswuchs



Quetschfaltenkamm



Wulstkamm/  
Walnusskamm



Steckdorn




Stützfalten im Kamm




Becher- oder  
Krohnenkamm




Hörnerkamm



Dachschwanz




Mehrfachdornkamm




Griffelzacken




Sägekamm




Spaltschwanz



Flügelücke/Spaltflügel




Kippflügel




Scherenflügel




Kalkbeine



Mehrfachsporn




Schwimmhaut




Entenfuß



Fischrücken



Garnelenschwanz



Quetschfaltenkamm



Drehfeder

### 3. Starke Übergrösse bei Zwerghühnern und Zwergenten. (ohne Abbildungen)

### 4. Gesichtsschimmel

Gesichtsschimmel bei Mittelmeerrassen und Jungtieren der nordwesteuropäischen Rassen mit weissen Ohrscheiben. (Bei Alttieren der nordwesteuropäischen Rassen ist Gesichtsschimmel kein grober Fehler.)

### 5. Augenfarbe

Andere als im Standard geforderte Augenfarbe, zweierlei Augenfarbe, Pupillenveränderungen.

### 6. Sporen

Fehlende Sporen bei Hähnen (Ausnahme: Perlhühner). Starke Sporenbildung bei Junghennen mit Ausnahme solcher, bei denen Hähne Doppelsporen haben oder Hennensporen laut Standard erwünscht sind. (Starke Sporenbildung bei Hennen ist gegeben, wenn die Sporen so gross sind, dass der Ring nicht mehr darübergestreift werden kann.)

### 7. Lauffarbe

Andere als im Standard geforderte Lauffarbe. (Ausnahme: Bei Haubenhühnern und nordwesteuropäischen Rassen mit blauer Lauffarbe gelten aufgehellte Zehen nicht als Ausschlussfehler, sondern je nach Aufhellung als leichter bis grober Fehler.)

## Ausschlussfehler beim Rassegeflügel sind je nach Rasse sehr unterschiedlich. (siehe Standart)

z.B. bei:

weißen Hühnerrassen:

stark gelber Anflug

schwarz Hühnerrassen:

Rost im Gefieder, andersfarbige Federn, Schilf ect.

Hühner mit roten Ohrscheiben:

weiß in den Ohrscheiben,....

bei columbifarbenen Hühnern:

stark durchstoßender Schaftstrich (Halszeichnung)  
viel weiß in den Steuerfedern

weißen Hühnerrassen:

stark gelber Anflug

bergische Landrassen:

zu schmaler Körper, zu steil oder zu flach getragener Schwanz, Hängeflügel, rötliche oder gelbe Ohrscheiben

weißen Hühnerrassen:

stark gelber Anflug

**So muss für jede Rasse der Standart extra berücksichtigt werden.**